

Z

f

i

S

v o n

D e n.

S a h r g a n g 1832.

H e f t I—XII.

(M i t 28 T a b l u.)

C e i p s i g b e y B r o c k h a u s,

1 8 3 2.

Vibrissae fusco-nigricantes; unguis corneo-fusci; auriculae unicolores (?); uropygii pili ut in congeneribus elongati. Longitudo 15 $\frac{1}{2}$ ", caudae circa 3—4", podarri ab apice unguis digiti intermedii ad finem tarsi 3 $\frac{1}{2}$ ". Habitat in Brasilia versus flumen Amazonum. (Mus. Monac.)

7. Ordo. URSI.

Zu dieser Ordnung habe ich in meinem Systeme, gleich allen übrigen Zoologen, die *Coatis* (*Nasuae*) gestellt. Sehr sorgfältige anatomische Untersuchungen überzeugten mich später, daß sie zu meiner Ordnung der Spitzmäuse (*Soricidae*) gehören, wo sie gewissermaßen, die ursprünglich eigenhümliche Sippe *Hylogale* (*Cladobates Cuv.*) vertreten. Als äußere Merkmale ihrer Ordnung betrübe ich vorläufig nur die Bildung ihrer Nase und ihrer Augen, so wie vorzüglich auch ihrer Eckzähne, welche, wie bei den Schweinen und Spitzmäusen, eine offene Wurzel haben und hohl (zum Theil auch wie bei diesen Thieren gestutzt und geslottet*) sind, da doch die Eckzähne der fleischfressenden Säugetiere eine derbe und geschlossene Wurzel haben.

II. Vögel.

Ordo STRIGES.

1. Genus. *Nyctolops*. (Gen. nov.)

Character generis *Oti Cuv.*, exclusis digitis totis nudis; remex zda omnium longissima.

N. stygius Wagl. (Spec. nov.) Caput, cum plumarum auriculis longis, collum, alae supra et notaeum tota fuliginoso-nigra; plumae frontis et areae apone aures ochraceo-, areae infra mentum allo-variolosae; colli plumae versus basin macula ochraceo-scente (extus non conspicua) notatae; remiges fuliginoso-nigrae, primariae intus maculis 2—3, secundarie ibidem fasciis pluribus albido-rufescens notatae; rectrices rufinigrae colore, fasciis interruptis 6—7 ochrascens dissectae, apice stricte albidae, intus basi ochraceae; tibiae, tarsi ac crissi plumae ochraceae, huius maiores fascia ante spicem nigrescente; reliquae gastrae partes (ut in *Oto nostro*) pallidae ochraceae, nigro—et albo—maculatae; alatum flexura obscura; margo carpi ochraceus; ilorum tectrices inferiores internae ochraceae, exteriores nigro-variae; rostrum (et digitus?) coeruleo-nigrum; unguis nigri; cauda longula apice rotundato-truncata. Longitudo 18 $\frac{1}{2}$ ", alae 12 $\frac{1}{2}$ ", caudae 6", tarsi 1" 6". Habitat in Brasilia sive in Africa meridionali. (Mus. Eichstaett.)

Mit der Sippe *Otos* zunächst verwandt, und dieser im Systeme unmittelbar nachzusehen. Von der Sippe *Scops*, wonit sie hinsichtlich der unbefiederten Zehen übereinstimmt, unterscheidet sie sich durch ihren allgemeinen habitus sowohl, als durch ihren vollständigen Ohrenfederkranz.

* Sieh Abb. 1831 S. 513. Zimmer.

2. Genus. *Ciccaba* Wagl. Trauercole.

Zu dieser neuen Sippe gehört als Gattung *Le Vailants Huhule*, *Daudins* und *Lathams Strix Huhula* aus Südamerica. Vieillot setzt diesen Vogel (Nouv. Dict. VII, p. 19.) zu seinen Sperbereulen, von denen sie sich jedoch durch ihren ganz anders gebildeten Schwanz, so wie durch ihre nackten Zehen unterscheidet, Cuvier zu Boies Sippe *Athene* (*Glaucidium*), deren Gattungen aber außer einem gänzlich verschiedenen gefärbten Gesicht einen unvollständigen Federkranz im Gesichte haben.

Character universalis *Syrnii*; rostrum Strigis; auriculae nullae, area plumarum mediocris, totum oculum cingens, circularis; remex 4 et 5 omnium longissimae, quarta quam quinta vix longior; digitus nudi; tarsus dense pluminosus; aures mediocres; cauda longula, lata, aequalis. — Color praedominans niger. Species: 1. *Ciccaba Huhula*. Fliegt auch bei Tage umher. Diese Sippe ist zwischen die Schleiereulen* (die einen sehr großen, herzähnlichen Gesichtsschleier und große Ohren haben) und Kauze (*Syrnum*) zu setzen.

Ordo HIRUNDINES.

A. Hirundines terrestres.

3. Genus. *Hydropsalis*, Wasserschreie (Nov. Gen.)

Character universalis *Caprimulgus*; cauda profunde furcata, rectrice utrinque extima elongatissima.

Species: 1. *Hydrops. Azarae* (Engoulement à queue en ciseau Azar. *Caprimulgus furcifer* Vieill., *Caprim. psalurus* Temm. Pl. col. 157 ♂ 158 ♀) — 2. *H. manurus* (*Caprim. manurus* Vieill. n. d. X, p. 239.)

Hydrops. Azarae erscheint in Paraguay mitten ins Winter (nie im Frühjahr oder Sommer); fliegt beständig über dem Wasser der Flüsse und an deren Ufern hin und her. Bei Änderungen der Flugrichtung breitet er die langen seitlichen Federn des Schwanzes wie die Klinge einer Schere auseinander.

B. Wasserschwalben.

4. Genus. *Planitis*, Wagl. (Gen. nov.), Manulára.

Rostrum subulatum, cornu paullulum inflexo-coarctatis; nares lineares, perviae; pedes breves; digitus anterior externus trium longissimus; cauda forcata; color praedominans fuliginosus; rostrum et pedes nigra. *Maris (australis) incola*.

Species: 1. *Sterna guttata* Reinh. Forst. in Manuscr. spec. nov. — (*Planitis guttatus*. —)

* Von diesen hat J. B. Geoffroy (Annal. des sc. nat. 1850 p. 201) die hörsfeidliche *Strix badius* aus Java getrennt und zur Sippe *Phodilus* erhoben, welche sich von unssetzt durch einige wesentliche Merkmale abgrenzt.