

W

r

i

S

v o n

D f e ll.

D a h r g a n g 1 8 2 6 , c r s t e r S a n d .
H e f t I — VI.

T e n a ,
A n d e r S p e d i t i o n .
1 8 2 6 .

von Stachelsäfern oder Chateigne (*hispa* L.) auf den Blättern einer Eistrose (*cistus*). — Zwei Arten von Staphylinen. Eine Art von spanischen Fliegen oder Canthariden. Endlich ein neues Geschlecht (genre), welches ich unter der Rinde des Lärchenbaums (*Pinus Larix*) gefunden habe, und welches den Übergang von den Lucasii zu den Scarabaeis zu bezeichnen scheint. — In den andern Geschlechtern sind die Arten, die man antrifft, fast alle auf dem europäischen Welttheil gemein.

Thierpflanzen oder Zoophyten.

In der Classe der Zoophyten findet man einige schöne Madreporen, 2 Arten von sehr merkwürdigen Seeigeln (*Ovurins*), eine Menge Seesterne, worunter man auch das Medusenhaupt bemerkte. Die Seesternen werden in der Bay von Sainte Croix in großer Menge gesucht.

Dies ist eine flüchtige Uebersicht der thierischen Erzeugnisse der canarischen Inseln; sie gibt nur eine sehr unvollkommene Vorstellung von der Naturgeschichte derselben; indeß, die schnelle Abreise des Schiffes, meine englischen Geschäfte und besonders meine geringen Kenntnisse erlauben mir nicht, noch mehr hinzuzufügen. Mit einer andern Gelegenheit will ich, wenn es gewünscht wird, alle Erfahrungen mittheilen, welche eine sechsjährige Beobachtung über die Geologie dieser Inseln, über ihre Temperatur und die verschiedenen atmosphärischen Veränderungen, die sich fand geben, mir hat verschaffen können, und dann werde ich auch versuchen, von den reichen Schätzen des Pflanzreichs auf die genaueste Weise Kenntniß zu geben, theils durch meine Beschreibungen, theils durch wirkliche Probederivate, die ich zu übersenden mich erbieite.

Drotava, im Herbst 1824.

S. Berthelot,

Direct. u. Prof. der Bot. u.
Ackerbau. an der gel. Schule
zu Drotava auf Teneriffa.

Generalübersicht

der ornithologischen Ordnungen, Familien und Gattungen.¹

Von F. Voie.

I. Ord. Raptore Vigors.

1. Fam. Gypogeanidae Vigors.

Gypogeanus Illig.: *Serpentarius* Cuv. *Falco serpentarius* Lin.

Dicholopus Illig.: *cristatus* Illig. col. 237.

Um dem Vorwurfe zu begegnen, daß die einzelnen Gattungen nicht immer in der natürlichen Reihe aufeinander folgen, mache ich nur darauf aufmerksam, daß es weniger meine Absicht gewesen sey, die Affinität der Gattungen zu behandeln, als vielmehr eine Generalübersicht derjenigen unter ihnen zu geben, welche nach meiner Meinung der Natur entsprechen, und daher angenommen

Jahrs 1826. Heft 2.

II. Fam. Vulturidae Leach. *Vultur* Lin.

Vultur Lin.: *V. cinereus* Lin. *V. angolensis* Lath.
u. a.

Cathartes Illig. *Neophron* Savigny: *Catharista*
Viell. *monachus* Tem. col. 222. u. a.

Sarcorhamphus Dumeril: *V. gryphus* Lin. u. *V. papa* Lin.

III. Fam. Falconidae Leach.

Polyberus Viell. *F. brasiliensis* Gm. u. a.

Gypaetus Storr. *Phene* Savigny: *Falco barbatus*
Gm.

Haliaetus Savigny: *Falco leucocephalus* Gm.; *Ma-*
ceci Cuv. col. 8. u. a.

Aquila Bechst.: *F. armiger* Shaw (*harpacter* Forst.)
Vaill. Afr. pl. 1. u. a.

Pandion Savig.: *F. haliaetus* Lin. u. a.

Circaetus Viell.: *F. gallicus* Gm. u. a.

Buteo Bechst. *tachardus* Shaw. Vaill. u. v. a.

Pernis Cuv.: *F. apivorus* Gm.

Astur Bechst. *Daedalion* Savig.: *F. columbarius*
Gm. u. a.

Morphus Cuv.: *F. guianensis* Daud. u. a.

Harpyia Cuv.: *F. cristatus* Gm. u. a.

Nisus Cuv.: *minullus* Vaill. u. a.

Cymindis Cuv.: *F. hamatus* Illig. u. a.

Certhneis: *F. rupicola* Lichst. u. s. w.

Hypotriorchis: *F. subbuteo* u. s. w.

Hieros Falco Cuv.: *F. Canarius* Gm. u. a.

Elanus Savig.: *F. melanopterus* Daud. Vaill. Afr.
pl. 36.

Milvus Savig.: *F. Riocurii*. Vaill. col. 85. u. a.

Circus Bechst.: *F. ranivorus* Shaw. Vaill. u. s. w.

IV. Fam. Strigidae Leach. *Strix* Lin.

Strix Lin.: *St. brasiliensis* Lichst. u. a.

Syrnium Savig.: *Strix nebulosa* Gm.

Bubo Cuv.: *St. africana* Tem. u. v. a.

Scops Savig.: *St. pulchella* Pall. u. a.

Glaucidium: *St. nana* Tem.; *passerina* Lin. u. a.m.

Athene: *St. nudipes* Daud. u. s. w.

Surnia Duméril: *St. choucou* Vaill. Afr. pl. 41.

V. Fam. Caprimulgidae Vigors. *Caprimulgus* Lin. 1.

Podargus Cuv. *Javanicus* Mersl. *Cornutus* Tem.
col.

Caprimulgus Lin.

zu werben verbieren. Auf Gattungen, die für eine einzelne Art aufgestellt sind, habe ich jedoch oft keine Rücksicht genommen, weil mir dieselben kein Gewinn für die Wissenschaft zu seyn schienen. — Die Charakteristik der von mir gebildeten findet man in einem für das 3te Heft des Drucks bestimmten Aufsage, in welchem ich der in der Jhs 1824 S. 562 ausgesprochenen Aufforderung des Hn. Prof. Ranvier ein Genüge zu leisten bemüht gewesen bin.