

naire; mais ils ont, tous, les sousalaires dépourvues de bandelettes foncées. Je n'insiste pas sur les autres caractères indiqués par GRAY pour sa *Baza stenzona* et même pas sur celui tiré du nombre des bandes caudales, puisqu'ils présentent de nombreuses variations individuelles. Aile 10 pouces 9 lignes à 11 pouces 2 lignes. D'après ce que je viens de dire, il me semble que ni l'oiseau d'Arou, ni celui de Salawatti ou de la côte voisine de la Nouvelle-Guinée présentent des traits assez essentiels pour sanctifier leur séparation spécifique de la *Baza Reinwardtii*.

NOCTUA ARUENSIS. — On sait que M. WALLACE n'a pas rencontré du tout, dans le groupe d'Arou, des oiseaux de proie nocturnes. M. VON ROSENBERG, quoique plus heureux que son prédécesseur, ne nous en a rapporté qu'un individu unique d'une chouette et deux individus d'un Scops dont nous parlerons à une autre occasion.

L'individu de la chouette dont nous venons de faire mention, se rapporte en tout point à l'oiseau décrit par nous (*Observations*, II, voir ce journal, Vol. 3, p. 256) sous le nom de *Noctua Franseni*; mais il est d'une taille beaucoup moins forte, nonobstant que ces deux individus appartiennent au même sexe, étant marqués comme femelles par nos voyageurs.

On pourra, du reste, juger de la différence de taille de ces deux oiseaux par l'exposé suivant des dimensions de leurs principales parties.

Noctua Franseni. Aile 11 pouces 8 lignes, queue 8 pouces 4 lignes, tarse 24 lignes, doigt du milieu 16 lignes et demie, bec 18 lignes.

Noctua aruensis. Aile 9 pouces 5 lignes, queue 6 pouces 4 lignes, tarse 17 lignes; doigt du milieu 17 lignes, bec 13 lignes.

Tarse, comme dans la *Noctua Franseni*, très-fortement emplumé, tandis que les doigts sont nus et seulement pourvus de soies raides excessivement clair-semées.

Nous rappelons ici que les auteurs n'ont fait mention jusqu'à présent que de deux chouettes originaires de la Nouvelle-Guinée et de ses dépendances, savoir: 1) la *Spiloglaux theomacha* de BONAPARTE (*Comptes rendus*, tome 41, 22 Oct. 1855) aux tarses demi-nus et que le prince dit provenir de la baie Triton à la Nouvelle-Guinée, et 2) l'*Athene humeralis* d'Hombron et Jacquinot, également aux pieds couverts de soies, mais rappelant, du reste, par son système de coloration les oiseaux dont nous venons de traiter. On conçoit que toutes ces indications sont insuffisantes pour l'établissement rigoureux d'espèces, et que nos données sur ces oiseaux n'ont d'autre but que de fournir quelques

faits isolés et de porter l'attention des naturalistes sur ces êtres si peu étudiés jusqu' à ce jour.

PSITTACULA MELANOGENIA, VON ROSENBERG, *Tijdschr. Nederl. Indië*, 1866. — Le groupe d'Arou nourrit une petite *Psittacula* échappée aux recherches de M. WALLACE, et dont M. VON ROSENBERG nous a fait parvenir quatre individus, savoir le mâle et la femelle adultes, et deux individus indiqués comme mâles mais portant la livrée de la femelle. Cette espèce se rattache par l'ensemble de ses formes et son système de coloration à notre *Psittacula GUILLEMI* III (*Observations*, II, dans ce journal-ci, Vol. 3, p. 252), originaire de Salawatti et de la côte* voisine de la Nouvelle-Guinée, et qu'elle paraît remplacer dans l'Archipel Arou. Cependant, elle est d'une taille beaucoup moins forte; toutes ses teintes sont moins vives; la barre noire de la région des oreilles est propre aux deux sexes; le jaune de la région des freins est remplacé par du blanc, et le bleu du front ainsi que de la raie surciliaire par du noirâtre; les grandes couvertures inférieures des ailes sont, au lieu d'un noirâtre uniforme, jaunâtres et seulement terminées de noirâtre; les rémiges enfin offrent, toutes, à l'exception des deux premières, une très-large bande jaunâtre à la moitié basale de leur barbe interne, tandis que cette bande est, dans la *Psitt. GUILLEMI* III, ou nullement prononcée, ou peu tranchante, passant insensiblement au noirâtre et réduite aux rémiges secondaires; le jabot enfin est constamment teint ou lavé de jaune ou rouge d'orange.

Aile 2 pouces 9 lignes à 2 pouces 11 lignes, queue 15 lignes, tarse 4 lignes et demie, doigt du milieu 6 lignes, bec 5 lignes. Nous rappelons que la *Psittacula GUILLEMI* III présente les dimensions suivantes: aile 3 pouces 4 lignes à 3 pouces 6 lignes, queue 19 à 21 lignes, tarse 5 lignes; doigt du milieu 7 lignes, bec 7 lignes.

Bec, iris de l'oeil et pieds d'un brun-gris noirâtre; ailes atteignant à-peu-près l'extrémité de la queue (VON ROSENBERG).

Mâle adulte. Teinte générale du plumage d'un vert d'herbe, passant au vert jaunâtre sur les parties inférieures, et au noirâtre sur les barbes internes des rémiges. Front, région des yeux et toute la partie postérieure de la région des oreilles et des plumes en moustache d'un noir peu foncé. Freins et joues blanchâtres. Il existe, derrière la région des oreilles, une très-large écharpe s'étendant sur le menton, et dont la teinte est d'un blanc lavé de jaune d'orange. Jabot d'un rouge d'orange foncé, mais peu vif. Bord ventral de l'aile jusque sur le bord externe des grandes rémiges bleu. Petites et moyennes couvertures in-