

della collezione Bruijn; questo ha quasi le stesse dimensioni del primo, per cui lo credo dello stesso sesso. Ambedue sembrano ben adulti avendo le parti superiori di un bel nero puro e le inferiori di colore rossiccio castagno senza macchie; questo colore delle parti inferiori è meno intenso nell'individuo della collezione Beccari, il quale ha la parte superiore del petto con *traccie* poco distinte di qualche fascia trasversale nericcia.

Questa specie appartiene al gruppo di quelle col collare cervicale rossiccio e si distingue facilmente da tutte le altre pel bel color nero delle parti superiori.

Probabilmente è questa una specie esclusivamente montana.

Fam. STRIGIDAE.

Sp. 5. *Scops beccarii*, nov. sp.

Supra fusco-brunnea, maculis, punctulis et fasciis albis et rufis varia; torque cervicali, e maculis albis crebrioribus et latioribus, parum conspicuo; scapularibus maculis latis albis in pogonio externo notatis; regione supra-oculari et loris albidis; plumis pilosis ad basin rostri albis, apice nigro; gula alba, fasciis nigris irregularibus ornata; torque subulari ex apicibus nigris plumarum; pectore et abdomine fasciis irregularibus, et punctulis nigris et rufis, et maculis albis latioribus variis; subcaudalibus albis, fasciis transversis rufis, antice et postice linea nigra marginatis, ornatis; alis fuscis, tectricibus alarum minoribus fasciis irregularibus et punctulis rufis variis, mediis et majoribus fasciis albis pogonio externo notatis; remigibus fuscis, pogonio externo maculis albidis in rufescentem colorem intus transeuntibus, secundum fascias dispositis, notatis; remigibus pogonio interno maculis albidis, vix rufescentibus et obliquis notatis; subalaribus albidis, nonnullis, praesertim margini carpalii proximis, nigro et rufo variis, majoribus maculis transversis, vel fasciis fuscis notatis; reatricibus fuscis, duabus mediis rufo-variis, reliquis pogonio externo fasciis rufis, interno albidis

notatis, extimis duabus etiam pogonio externo albo-maculatis; tarsi plumis albis, fusco-marginatis, obtectis; parte ima tarsi et digitis omnino nudis; rostro fusco, culmine maxillae et parte infera mandibulae flavidis; digitis forsan flavis, in exuvie pallidis.

Long. tot. circa 0^m,250; al. 0^m,175; caud. 0^m,090; rostri hiat. 0^m,023; tarsi 0^m,034.

Hab. Insula Misori.

Un solo individuo di questa specie è stato raccolto in Soweik dal Beccari. Esso è indicato come maschio.

Questa bellissima specie somiglia per le dimensioni allo *S. magicus*, ma è ben distinta da tutte per mancare delle strie longitudinali nere lungo il mezzo delle piume delle parti inferiori e delle superiori, per cui il disegno appare più uniforme; inoltre sulle parti inferiori prevale un disegno a macchie e strie trasversali.

Fam. PSITTACIDAE.

Nasiterna bruijni, SALVAD.

Il Bruijn ed il Beccari hanno inviato altri individui, tutti dei Monti Arfak, di questa bella specie, da me recentemente descritta, due maschi e due femmine il Bruijn, tre maschi ed un giovane, probabilmente femmina, il Beccari.

I maschi sono simili a quello descritto e figurato (Tav. XXI), tranne uno che ha il pileo e le gote di color rosso, quasi così vivo come il mezzo delle parti inferiori, le quali in esso sono di un colore rosso più vivo che non nell'individuo tipo e negli altri quattro maschi; evidentemente esso è un maschio vecchissimo.

La femmina è notevolmente diversa:

Viridis, subtus pallidior, paulo flavicans; pileo laete caeruleo; genis et margine frontali griseo-rubrescentibus; gula albidogrisea, vix caerulescente tincta; subcaudalibus viridi-flavicantibus;