

2° *Cheirogalus Coquereli*. (Nob.) Similis Ch. furciferi, sed paulo minor; cinereo-fuscus, rufo irroratus; cauda maxima parte (basi corpore concolore excepta) rufo-nigricante. Quatuor mammis sicut Ch. furcifer. Jugulo pectore, abdomineque cinereo-fulvis. Auribus ut Ch. furciferi. — Long. corp. 0^m,21; caud. 0^m,34.

J'ai eu en ma possession sept de ses Chéirogales. Ce sont des animaux nocturnes qui vivent de feuilles et de fruits. Je les ai trouvés à Morondova. Nom malgache : Sisiba.

3° *Galidia decemlineata*. (Nob.) Albida, brunneo-tesselata, ut pluræque mangustæ. Dorso octo, lateribus duabus lineis rufescentibus notatis. Jugulo, pectore, abdomine, artibus intus, pedibusque extus fulvis. — Long. corp. 0^m,30; caud. 0^m,24.

Ce sont de petits animaux très-vifs et très-gracieux qui s'approvoient facilement. Ils ont toutes les habitudes des autres galidies. Nom malgache : Bouqui.

4° *Sus madagascariensis*. (Nob.) Similis S. guineensi : intense rufus, lateribus nigricantibus. Setis longis nec brevibus; auribus penicillis destitutis neque apicibus allopilosis. Cauda brevior, vix poplites superante, glabra, apice extrema excepta. Sub genis nigris, setis longissimis albidis. Juga nigra, vix albo variegata. Pilis brevibus subraris nigris regionem ovalem fere liberam linquentibus.

OISEAUX.

1° *Nisus Polleni*. (Nob.) Supra dilute fuscus, albedine laterali plumarum in nucha et dorso valde conspicua; subtus albus, nigricante-fusco fasciolatus (juv. maculis oblongis fuscis notatus); rectricibus cinerascence-fuscis 5-6 fasciis latis fuscis; subcaudalibus albis. Tarsis digitisque gracilibus. Cera pedibusque flavis. — Long. 0^m,31; al. 0^m,17; caud. 0^m,155; rostr. a rict. 0^m,015; tars. 0^m,05; dig. med. cum ung. 0^m,036.

2° *Scops madagascariensis*. (Nob.) Similis Sc. brasiliensi,

statura tantum minori et coloribus obscurioribus distinctus. — Long. 0^m,22; al. 0^m,16; caud. 0^m,083; rostr. a rict. 0^m,019; tars. 0^m,023; dig. med. cum ung. 0^m,015.

3° *Ellisia Lantzii*. (Nob.) Cinereo-rufescens, gula albi-da, abdomine cinerescente. — Long. 0^m,17; al. 0^m,063; caud. 0^m,09; rostr. a rict. 0^m,016; tars. 0^m,023; dig. med. cum ung. 0^m,015.

4° *Muscicapa madagascariensis*. (Nob.) Supra cinerea, subtus alba; pileo nigro, nitore æneo; fronte cinerascende; nucla alba. — Long. 0^m,20; al. 0^m,115; caud. 0^m,09; rostr. a rict. 0^m,021; tars. 0^m,022; dig. med. cum ung. 0^m,018.

5° *Coua Coquereli*. (Nob.) Supra læte olivaceo-viridis nitore cupreo; mento albido; jugulo olivascente; pectore abdomineque cinnamomeo-rufis; rectricibus lateralibus apice albis; crisso brunneo-rufescente; rostro pedibusque nigris; iride rubra. — Long. 0^m,40; al. 0^m,145; caud. 0^m,225; rostr. a rict. 0^m,029; tars. 0^m,043; dig. ext. cum ung. 0^m,036.

6° *Coua cursor*. (Nob.) Supra olivacea; gula ochracea; pectore lilacino; abdomine albescente; subcaudalibus cinereis; rectricibus lateralibus apice albis. Rostro nigro pedibusque corneis; iride rubra. — Long. 0^m,36; al. 0^m,13; caud. 0^m,19; rostr. a rict. 0^m,026; tars. 0^m,042; dig. ext. cum ung. 0^m,031.

7° *Coua Verreauxi*. (Nob.) Crista occipitali ex plumis 0^m,04 longis, basi cinereis, apice chalybeo virescentibus. Supra cinereo-virescens; remigibus splendide virescentibus, nitore aureo, rectricibusque cærulescentibus, lateralibus albo-terminatis; gutture pectoreque cinereis; crisso subcaudalibusque albidis. Rostro pedibusque nigris iride rubra. — Long. 0^m,34; al. 0^m,125; caud. 0^m,195; rostr. a rict. 0^m,022; tars. 0^m,039; dig. ext. cum ung. 0^m,033.

8° *Coua pyropyga*. (Nob.) Similis C. cristatæ, sed major. Crista occipitali ex plumis 0^m,047 longis cinereis; fascia superciliari nigra; dorso cinereo-virescente; remigibus secundariis virescentibus, primariis rectricibusque splen-