

***Caprimulgus macrurus obiensis* subsp. nova**

Typus Nr. 21 497: ♂ ad., 26. Juli 1953, DE HAAN leg. Nr. 1763. — Material: 3 ♂♂.

Diagnose: Noch dunkler als die von Halmahera beschriebene Rasse *C. m. schillmölleri*, mit breiteren schwarzen Mittelflecken der Federn des Hinterkopfes und des Schwanzes. Gelbbraune Säume der Flügeldecken düsterer als bei *schillmölleri*. Flügel 178–185 ($D_3 = 182,3$); Schwanz 143–149 ($D_3 = 146,7$) mm.

***Otus magicus obira* subsp. nova**

Typus Nr. 21 496: ♂ ad., Madopolo auf Obi-Bisa, 1. November 1953, DE HAAN leg. Nr. 1899. — Material: 3 ♂♂, 2 ♀♀.

Diagnose: Im Vergleich zu *O. m. leucospilus* (Halmahera), *magicus* (Ceram) und *bouruensis* (Buru) oben und unten dunkler, weniger gefleckt. Grundfarbe der Unterseite bei *obira* bräunlich, bei *leucospilus* an Bauch und Unterschwanzdecken mehr oder weniger weißlich. Flügel ♂ 170, 172, 172; ♀ 168, 171 mm. Gewicht ♂ 146, 147, 148 g; ♀ 128, 142 g (beide vom Oktober).

***Megaloprepia formosa micra* subsp. nova**

Typus Nr. 21 523: ♂, 8. August 1953, WEGNER leg. Nr. 41. — Material: 5 ♂♂, 5 ♀♀.

Diagnose: Kleiner als *M. f. formosa* und mit relativ kürzerem Schwanz. Flügel ♂ 130–138 ($D_5 = 133,8$), ♀ 128–137 ($D_5 = 133,0$) mm; Schwanz ♂ 109–126 ($D_5 = 117,4$), ♀ 106–119 ($D_5 = 112$) mm.