

tusschen Celebes en Nieuw-Guinea gevonden wordt. Andere vogelen, door ons in de Molukken verzameld, en aldaar min of meer sporadisch voorkomende, zijn: *Falco leucogaster* en *pondicerianus*, *Lamprotonis metallicus*, *Colaris orientalis*, *Nectarinia aspasia*, *Alcedo dea*, *sacra* en *bengalensis*, *Cuculus orientalis* en *tenuirostris*, *Macropteryx mystacea* (*), *Cypselus esculentus*, *Strepsilas collaris*, *Tringa subarquata*, *Ardea novae-hollandiae* en *scapularis*, *Numenius minor* (†), *Carbo sulcirostris*, en eenige anderen. Onder de, tot dusverre nergens anders gevondene, nieuwe soorten van Amboina, voeren wij hier alleen aan eenen sperwer (§) en eenen kleinen hoornuil (*). — Ten opzichte der Amphibiën bepaalt zich onze kennis van den Molukschen Archipel nagenoeg alleen tot het eiland Amboina; noch van Ceram, Gilolo en de overige eigenlijke Molukken, noch van de groep der Banda-eilanden, is ons eenig tweeslachtig dier tot heden bekend. Geen wonder derhalve, wanneer wij voor alsnog buiten het bezit zijn van zoodanige vormen, welke zich als bijzonder kenschetsend voor het onderhavige land zouden laten aanmerken. Wij laten al de door ons te Amboina waargenomen soorten hier volgen; de beknoptheid onzer naamlijst moge andere natuuronderzoekers aanmoedigen om dezelve, zoo mogelijk, te vergrooten. Uit de orde der schildpadachtigen (Chelonii) verkregen wij: *Chelonia viridis* en *Emys couro*; uit die der hagedisachtigen (Saurii): *Crocodylus hiporcatus*, *Basiliscus amboinensis*, *Monitor chlorostigma*, *Scincus gigas*, *smaragdinus*, *Kuhlii* en *cyanurus*, *Calotes cristatellus*, *Draco lineatus*, *Platydactylus vittatus* en *monorchis*, en *Hemidactylus frenatus*. Uit de orde der slangen (Ophidii): *Calamaria brachyorrhos*, *Homalopsis Schneideri*, *Lycodon modestus*, *Boa carinata*, *Python Schneideri* en *amethystinus*, *Dipsas irregularis*, *Dendrophis picta* en *rhodopleuron*, *Hydrophis colubrina* en *pelamis*; zijnde er buitendien vroeger door

(*) *Cypselus mystaceus* (Voy. de la Coquille, Pl. 22). Deze fraaije soort, door den Heer Lesson aan de noord-oostkust van Nieuw-Guinea verzameld, vormt met *Cypselus comatus* (Pl. col. 268) en *Cyps. longipennis* (Pl. col. 83. fig. 1.) eene zeer natuurlijke groep, welke, zoowel wat de lichaamsgedaante als de levenswijze dezer vogelen betreft, het midden houdt tusschen de eigenlijke zwaluwen (*Hirundo*) en de gier- of muurzwaluwen (*Cypselus*). Met deze laatsten stemmen de drie genoemde zwaluw-soorten, ten opzichte van hare pijlsnelle vlugt, overëen, maar zij zetten zich dikwerf, even als de eigenlijke zwaluwen, op de boomen neder, waartoe zij dan gewoonlijk de zoodanigen kiezen, die op boschvelden, langs rivieren, wegen enzv. eenigzins vrij staan en dorre takken hebben.

(†) Deze nog onbeschreven *Numenius* is een weinig kleiner dan *Numenius brevirostris* (Pl. col. 381), bedragende zijne geheele lengte, van de punt des beks tot aan die van den staart, 0,316 m., waarvan de bek, van den mondhoek gemeten, 0,054, en de eenigzins afgeronde staart 0,079 beslaan. De kleur van het bovenlijf vertoont over het geheel groote gelijkenis met die van *N. phaeopus*, terwijl alle de benedendeelen, door hunne vuil wit-gele grondkleur en door de zwartachtig bruine schaftstrepen der vederen, bijkans volkomen overeenstemmen met het benedenlijf van *N. brevirostris*. Het gelaat is witachtig; eene breede streep van diezelfde kleur loopt overlangs boven ieder oog, van den bek tot aan den achterkop, terwijl tevens op het midden van den kop eene witachtige overlangsche lijn zichtbaar is. Bek zwart, doch de achterste helft der mandibula vleeschkleurig; pooten bleek loodkleurig; nagels zwart; iris bruin. Wij verkregen slechts een enkel individu dezer soort, van het mannelijke geslacht; dezelve is overigens, behalve op Amboina, ook aan de kusten van Nieuw-Holland waargenomen.

(§) *Falco hiogaster*, zeer naauw verwant aan *F. torquatus* van Timor, doch in den ouden staat gemakkelijk van dezen te onderscheiden, door zijn geheel éénkleurig roest-rood benedenlijf, zonder het minste spoor van dwarslijnen; de kop, achterhals en alle overige bovendeelen zijn graauwachtig blaauw. Iris donker rood; oogleden, mondhoeken, was-huid en pooten oranje-geel; bek en nagels zwart. De inlanders noemen hem *Manehi*.

(*.) *Strix magica*, verschilt in kleur en teekening weinig van *St. noctula* (Pl. col. 99), maar is de helft grooter, ten naasten bij als *St. passerina*. Iris geel, bek en nagels bruin. Het bijgeloof wil, dat deze uil den mensch somwijlen onheilen zoude voorspellen, waarom hij in het gewone leven *Boerong Swanggi* wordt genoemd: een' wigchelaar, boven-natuurlijken of toover-vogel beteekenende.