

VOYAGE
DE DÉCOUVERTES
DE
L'ASTROLABE

Exécuté par ordre du Roi,

PENDANT LES ANNÉES 1826 - 1827 - 1828 - 1829,

SOUS LE COMMANDEMENT

DE M. J. DUMONT D'URVILLE.

*

Zoologie

PAR

MM. QUOY ET GAIMARD.

*

TOME PREMIER.

*

PARIS
J. TASTU, EDITEUR-IMPRIMEUR,
N° 36, RUE DE VAUGERARD.

1830

—

GENRE SCOPS. — *Scops*, Savigny.SCOPS DE MANADO, *femelle*.*Scops manadensis*, nob.

PLANCHE 2, FIGURE 2.

Scops, corpore suprâ griseo nigro et albo striato; remigibus lunulatis; gulâ subalbidâ; abdomine albo, nigro et fulvo striato.

Petite espèce, de 7 pouces de long, ayant les ailes aussi longues que la queue et les aigrettes à peine sensibles; le bec est court, recourbé sur lui-même et noirâtre; les soies qui l'entourent sont d'un roux clair; les narines sont renflées et percées vers le sommet. Tout le dessus de la tête et du corps est d'un roux foncé pointillé et strié de noir avec de petites taches blanches arrondies sur la tête; les grandes plumes sont d'un roussâtre finement strié de noirâtre et présentant des taches d'un fauve clair qui tendent à former des bandes bordées de noir. La gorge est rousse et chaque plume a sa tige largement marquée de noir; le ventre est agréablement mélangé de taches fauves, noires et blanchâtres; les tarses sont couverts de plumes rousses et noires; les pieds et les ongles sont noirâtres; la queue est arrondie.

Nous avons rapporté ce Scops du district de Ma-

nado, sur l'île Célèbes ; il paraît être le même qu'un individu provenant de Java, que l'on voit dans les galeries du Muséum. Le plumage de ces oiseaux a, en général, beaucoup de rapports avec celui des Podarges.

Parmi les individus que nous a offerts l'île Célèbes, nous avons remarqué quelques variétés dans le plumage qui est plus clair ou plus foncé et dont les stries noires du dos sont plus ou moins bien indiquées, de même que les taches du rebord des grandes pennes alaires qui sont ou plus rapprochées ou plus fauves.



1. CHEVRÉ DE LA SOCIÉTÉ ASIATIQUE. (1800)

2. SCOPS DE HANNOU. (1800)