

## I. TRAVAUX INÉDITS.

DESCRIPTIONS de quelques nouvelles espèces d'Oiseaux,  
par le docteur G. HARTLAUB.

1. STRIX THOMENSIS, Nob. — *Mas.* S. supra nigricante-cinerea, punctulis minutis pallidioribus maculisque plumarum antepicalibus albis nigro-marginatis notata; facie læte cinnamomea, regione periophthalmica margineque coronæ inferiore nigricantibus; corpore subtus læte et intense ex aurantiaco rufo, maculis subtriangularibus vel subrotundatis nigricante-fuscis; subcaudalibus tibiisque immaculatis; subalaribus minoribus sparsim maculatis; rectricibus pallide ferrugineis, obscure variegatis, fasciis tribus latis nigro fuscis, apicibus omnium latius fuscis, macula minuta irregulari albida ante ipsum apicem notatis, remigibus simili modo pictis, prima nigricante subconcolore; axillis fulvis; rostro brunneo, unguibus nigricantibus.

Longit. tota,	14" 2/3	16".	(Capensis, Sw.)
— Alæ,	8" 4"	12" 8".	
— Caudæ,	4" 5"	5" 5".	
— Tarsi,	2" 2" 1/2	3" 5".	

L'unique exemplaire de cette belle espèce de Chouette fut envoyé par le voyageur naturaliste C. Weiss, de l'île équatoriale africaine *Saint-Thomé*, au Musée de Hambourg. C'est un mâle adulte. Au premier abord, nous avons pris cette espèce pour une race locale de *Strix capensis*, Sw.; mais, après l'avoir examinée plus attentivement, nous pensons que c'est une bonne espèce nouvelle. Le coloris de la queue, par exemple, est tout-à-fait différent.

2. ZONOTRICHIA MYSTACALIS, Nob. — Z. capite et collo cinereis, supra obsolete brunneo maculatis, gula spatiosa inter ocu-